

Neuscorrectie

Inleiding

De neus bevindt zich centraal in ons aangezicht. Een afwijkende vorm of grootte wordt door veel mensen als storend ervaren. Bovendien kan soms ook de functie van de neus onvoldoende zijn, zoals bijvoorbeeld een verminderd doorgankelijkheid bij een scheve neus na een ongeval. Een neuscorrectie of rhinoplastiek kan een oplossing zijn voor deze problemen.

Elke operatie brengt onzekerheid en risico's met zich mee

Resultaten van een operatie zijn niet altijd even gemakkelijk te voorspellen en daarom streeft uw dokter ernaar u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat u kan verwachten. Als uw verwachtingspatroon van de ingreep realistisch is, voorkomt dit teleurstellingen achteraf. De neuscorrectie is met name bij mannen een ingreep waarover de verwachtingen nog al eens hoog gespannen zijn. Het resultaat van deze ingreep wordt echter niet alleen bepaald door de deskundigheid van de plastisch chirurg, maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie veroorzaakt een verbetering en meestal geen perfectie.

Operatieplanning

Een neuscorrectie wordt meestal uitgevoerd om de neus te verkleinen, om de vorm van de neuspunt te verbeteren, om de bult van de neusrug te verwijderen en om een scheefstaande neus recht te zetten. Afhankelijk van de wensen van de patiënt wordt besproken welke veranderingen er gedaan zullen worden. Meestal worden er foto's genomen en wordt de geplande ingreep tijdens een tweede bezoek nogmaals aan de hand van deze foto's doorgenomen. De ingreep is onomkeerbaar en bij gevolg moet de patiënt deze ingreep zelf wensen en zich zeker niet laten leiden door de omgeving. Als er functionele klachten bestaan kan de verzekering (een deel van) de kosten van de ingreep vergoeden.

Vóór de ingreep

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine®, Marcoumar®, Sintrom®, Ascal®, Asaflow®, Asprobruis®, Cardio-aspirine®) moet u dit melden tijdens het gesprek. Het gebruik van deze medicijnen moet u drie tot tien dagen vóór de neuscorrectie staken. U krijgt hierover instructies van de behandelende arts. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw arts raadt u daarom aan om minstens 4 weken vóór de operatie volledig te stoppen met roken. Ook andere medicijnen moet u melden, evenals eerder ondergane operaties en andere gezondheidsproblemen. Een neuscorrectie kan onder locale verdoving of in dagbehandeling gebeuren, maar soms wordt u enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep en van de behandelende chirurg.

Werkwijze

Een neuscorrectie duurt gemiddeld één tot drie uur en vindt plaats onder algemene narcose of onder plaatselijke verdoving. Er bestaan diverse operatietechnieken voor een neuscorrectie. Uw plastisch chirurg zal u vóór de operatie informeren over de techniek van zijn of haar keuze. Bij de meest gebruikte techniek worden er sneetjes in het slijmvlies van de neus gemaakt en soms ook op de onderkant van de neus. Er zijn een aantal structuren die gecorrigeerd kunnen worden: het neusbot, het neustussenschot, de kraakbeentjes van de neusvleugels en van de neuspunt en ten slotte andere diepere structuren.

Na de ingreep

Na de operatie valt de pijn over het algemeen mee. Soms zitten er gazen in de neus en vaak wordt gedurende enkele dagen een beschermingskapje over de neus gezet. Door de gazen in de neus moet u door uw mond ademen. De neus zal opgezet zijn en gestuwd aanvoelen. Dit gevoel verdwijnt geleidelijk. Zodra de gazen eruit zijn kan u weer vrij ademen, wat echter na enige tijd kan verminderen door zwelling van de slijmvliezen.

Ook het gevoel in de neus kan veranderd zijn, met name als er een sneetje onder de neus is gemaakt. Het kan lang duren vooraleer de neus weer normaal aanvoelt. Aan de buitenzijde van de neus worden hechtingen gebruikt die na 5 à 6 dagen verwijderd moeten worden. De hechtingen in de neus lossen vanzelf op. De littekens worden meestal smaller en witter, maar kunnen ook breder worden. U mag een littekencreme aanbrengen op de uitwendige littekens als ze goed genezen zijn. In de neusgaten helpt een verzachtende zalf of olie om korsten los te maken.

Risico's en complicaties

Een neuscorrectie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er is een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing en op een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat. Er wordt de grootste mogelijke zorg besteed tijdens de operatie. Het kan zijn dat het resultaat voor de patiënt niet geheel beantwoordt aan zijn verwachtingspatroon. Na de operatie kan het gevoel in de neus verminder of zelfs geheel verdwenen zijn. Vaak komt het gevoel terug, maar niet altijd volledig. De littekens zijn gedurende enige tijd rood en soms gevoelig. Dit verbetert na verloop van tijd.

Terug naar de normale routine met uw nieuw uiterlijk

De resultaten van een neuscorrectie stemmen meestal tot tevredenheid en hebben een blijvend karakter. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor een goed resultaat. Bovendien duurt het zeker zes maanden voor de neus zijn definitieve vorm heeft. Vaak geeft een neuscorrectie meer zelfvertrouwen en is er minder commentaar van de omgeving. De littekens zijn meestal niet waarneembaar. Soms kunnen ze minder fraai worden ten gevolge van een gestoorde wondgenezing. Incidenteel is een tweede operatie nodig om een optimaal resultaat te bereiken.

Ten slotte

De folder bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen vooraf op papier te zetten. Indien u nog aanvullende informatie zoekt kan u die vinden op onze website www.esthetiek-groep.com.

Neuscorrectie

Duinbergen Clinic

Duinbergenlaan 33
8300 Knokke-Heist, België/Belgium
Telefoon: +32 50 530 640
E-mail: info@duinbergen-clinic.be
Web: www.duinbergen-clinic.be

Member of




DUINBERGEN CLINIC

www.duinbergen-clinic.be